

FR

# QUELS VACCINS POUR QUI?

Vaccin	Plateforme	Souche	Utilisation	Population				
				≥ 6 mois	≥ 5 ans	≥ 12 ans	≥ 18 ans	≥ 30 ans
<b>Comirnaty</b> (BioNTech)	<b>ARNm</b>	Souche originale	Primovaccination	✓	✓	✓	✓	✓
		Souche originale et/ou BA.1 & BA.4-5 variants	1 <sup>er</sup> et 2 <sup>ème</sup> Booster*	Dose pédiatrique pour bébés	Dose pédiatrique pour enfants	✓	✓	✓
<b>Nuvaxovid</b> (Novavax)	<b>Protéine</b>	Souche originale	Primovaccination				✓	✓
		Souche originale	1 <sup>er</sup> et 2 <sup>ème</sup> Booster**				✓	✓
<b>Janssen</b> (J&J)	<b>Vecteur viral</b>	Souche originale	Primovaccination				✓	✓
		Souche originale	1 <sup>er</sup> et 2 <sup>ème</sup> Booster				✓	✓
<b>Spikevax</b> (Moderna)	<b>ARNm</b>	Souche originale	Primovaccination					✓
		Souche originale et/ou BA.1 & BA.4-5 variants	1 <sup>er</sup> et 2 <sup>ème</sup> Booster*					✓

\* Peut être administré au plus tôt 8 mois après la troisième dose ainsi qu'après l'infection ou 4 mois après la dernière vaccination.

\*\* Peut être administré en cas d'effets secondaires des vaccins ARNm.

En cas d'infection antérieure, la vaccination peut être administrée 4 semaines après la première ou la deuxième dose ou encore, après la première dose de rappel et 4 mois après la deuxième dose de rappel.

# WHICH VACCINES FOR WHOM?

Vaccine	Platform	Strain	Use	Population				
				≥ 6 months	≥ 5 years	≥ 12 years	≥ 18 years	≥ 30 years
<b>Comirnaty</b> (BioNTech)	<b>mRNA</b>	Original strain	Primary Vaccination	✓ <i>Baby pediatric dose</i>	✓ <i>Children pediatric dose</i>	✓	✓	✓
		Original strain and/or BA.1 & BA.4-5 variants	1 <sup>st</sup> and 2 <sup>nd</sup> booster*			✓	✓	✓
<b>Nuvaxovid</b> (Novavax)	<b>Protein</b>	Original strain	Primary Vaccination				✓	✓
		Original strain	1 <sup>st</sup> and 2 <sup>nd</sup> booster**				✓	✓
<b>Janssen</b> (J&J)	<b>Viral Vector</b>	Original strain	Primary Vaccination				✓	✓
		Original strain	1 <sup>st</sup> and 2 <sup>nd</sup> booster**				✓	✓
<b>Spikevax</b> (Moderna)	<b>mRNA</b>	Original strain	Primary Vaccination					✓
		Original strain and/or BA.1 & BA.4-5 variants	1 <sup>st</sup> and 2 <sup>nd</sup> booster*					✓

\* Can be administered at the earliest 8 months after the third dose and after the infection or 4 months after the last vaccination.

\*\* Can be administered if there are side effects to mRNA vaccines.

In case of prior infection, vaccination can be administered 4 weeks after the first or second dose or 1<sup>st</sup> booster and 4 months after the 2<sup>nd</sup> booster.

# WÉI ENG IMPFSTOFFER FIR WEEN?

Impfstoff	Plattform	Stamm	Benutzung	Bevölkerung				
				≥ 6 Méint	≥ 5 Joér	≥ 12 Joér	≥ 18 Joér	≥ 30 Joér
<b>Comirnaty</b> (BioNTech)	<b>mRNA</b>	Urspréngleche Stamm	Éischtimpfung	✓	✓	✓	✓	✓
		Urspréngleche Stamm an/oder BA.1 & BA.4-5 variants	1. an 2. Booster*	Pädiatrische Dosis fir Poppelcher	Pädiatrische Dosis fir Kanner	✓	✓	✓
<b>Nuvaxovid</b> (Novavax)	<b>Protein</b>	Urspréngleche Stamm	Éischtimpfung				✓	✓
		Urspréngleche Stamm	1. an 2. Booster**				✓	✓
<b>Janssen</b> (J&J)	<b>Viralvektor</b>	Urspréngleche Stamm	Éischtimpfung				✓	✓
		Urspréngleche Stamm	1. an 2. Booster				✓	✓
<b>Spikevax</b> (Moderna)	<b>mRNA</b>	Urspréngleche Stamm	Éischtimpfung					✓
		Urspréngleche Stamm an/oder BA.1 & BA.4-5 variants	1. an 2. Booster*					✓

\* Kann net méi fréi wéi 8 Méint no der drëtter Dosis an no enger Infektioun verwalt ginn, oder 4 Méint no der leschter Impfung.

\*\* Kann verwalt ginn wann negativ Reaktiouen op mRNA Impfungen optrieden.

Am Fall vun enger fréierer Infektioun kann d'Impfung 4 Wochen no der éischter oder zweeter Dosis oder nom éischte Booster a 4 Méint no der zweeter Booster gemaach ginn.

# WELCHE IMPFSTOFFE FÜR WEN?

Impfstoff	Plattform	Stamm	Verwendung	Bevölkerung				
				≥ 6 Monate	≥ 5 Jahre	≥ 12 Jahre	≥ 18 Jahre	≥ 30 Jahre
<b>Comirnaty</b> (BioNTech)	<b>mRNA</b>	Ursprünglichen Stamm	Erstimpfung	✓	✓	✓	✓	✓
		Ursprünglichen Stamm und/oder BA.1 & BA.4-5 variants	Erster und zweiter Booster*	Pädiatrische Dosis für Babys	Pädiatrische Dosis für Kinder	✓	✓	✓
<b>Nuvaxovid</b> (Novavax)	<b>Protein</b>	Ursprünglichen Stamm	Erstimpfung				✓	✓
		Ursprünglichen Stamm	Erster und zweiter Booster**				✓	✓
<b>Janssen</b> (J&J)	<b>Viralvektor</b>	Ursprünglichen Stamm	Erstimpfung				✓	✓
		Ursprünglichen Stamm	Erster und zweiter Booster				✓	✓
<b>Spikevax</b> (Moderna)	<b>mRNA</b>	Ursprünglichen Stamm	Erstimpfung					✓
		Ursprünglichen Stamm und/oder BA.1 & BA.4-5 variants	Erster und zweiter Booster*					✓

\* Kann frühestens 8 Monate nach der dritten Dosis sowie nach einer Infektion, oder 4 Monate nach der letzten Impfung verabreicht werden.

\*\* Kann verabreicht werden, wenn Nebenwirkungen auf mRNA-Impfstoffe auftreten.

Im Falle einer früheren Infektion kann die Impfung 4 Wochen nach der ersten oder zweiten Dosis oder nach der ersten Booster-Impfung und 4 Monate nach der zweiten Booster-Impfung verabreicht werden.