

Важная информация о поствакцинальном периоде




Что мне нужно делать после вакцинации?

- › В зависимости от используемой вакцины могут быть необходимы две дозы: Проверьте, записались ли Вы на прием для получения второй дозы вакцины в центре вакцинации. Соблюдение сроков необходимо для гарантии высокой эффективности вакцины.
- › Иммуитет вырабатывается в течение первых недель после полной вакцинации. Поэтому Вы не будете тотчас защищены от COVID-19!
- › Есть вероятность того, что Вы сможете заразить людей из Вашего ближайшего окружения COVID-19. Продолжайте соблюдать меры безопасности.
- › Продолжайте участвовать в масштабном тестировании, даже если Вы вакцинированы.



Что мне нужно делать в случае возникновения побочных эффектов?



- › Вакцины, как и другие лекарственные препараты, могут вызывать побочные эффекты.
- › Наиболее часто встречаются следующие побочные эффекты: боль в месте инъекции, усталость, головная боль, ломота, озноб, боли в суставах и температура.
- › Если у Вас появились побочные эффекты, **сообщите о них Вашему врачу или** обратитесь в аптеку. Это касается любых нежелательных реакций, которые, по Вашему мнению, могут быть связаны с введенной Вам вакциной. Вы также можете непосредственно сообщить о них через национальную систему передачи информации: <https://gd.lu/3DL2gh>
- › Информацию о вакцине можно найти на сайте covidvaccination.lu в рубрике **InfoVAXX**.



Не прекращайте выполнять привычные действия и соблюдайте меры безопасности



Информация о тромбозе

Минимальный риск тромбоза после вакцинации вакцинами Vaxzevria® (AstraZeneca) или Janssen (Johnson & Johnson)

Нетипичные случаи образования сгустков крови с небольшим уровнем тромбоцитов были зафиксированы у лиц, вакцинированных вакцинами Vaxzevria® или Janssen.

Риск возникновения таких побочных эффектов крайне низкий, но, тем не менее, Вам следует обратить внимание на появление возможных симптомов, чтобы немедленно пройти курс лечения для выздоровления и во избежание осложнений.

Какие вероятные симптомы тромбоза, вызванного вакцинацией?

- › одышка
- › боль в груди
- › отек ног
- › непрекращающаяся боль в животе
- › неврологические симптомы, такие как, непрекращающаяся сильная головная боль или нарушение зрения
- › мельчайшие пятна крови под кожей за пределами места инъекции

Что мне нужно делать при возникновении этих симптомов??

Вы должны немедленно посетить дежурного врача, если у Вас появится хотя бы один из вышеуказанных симптомов в течение нескольких недель после инъекции. Свяжитесь с Вашим лечащим врачом. Вы также можете связаться с дежурной медицинской службой.

В экстренных случаях звоните по номеру экстренной службы 112.

Вы также можете сообщить о побочных эффектах через национальную систему передачи информации: <https://gd.lu/3DL2gh>

