

WHICH VACCINES FOR WHOM?

Vaccine	Platform	Strain	Use	Population				
				≥ 6 months	≥ 5 years	≥ 12 years	≥ 18 years	≥ 30 years
Comirnaty (BioNTech)	mRNA	Original strain	Vaccination and revaccination*		✓	✓	✓	✓
		Variant Omicron BA.1 & BA.4.5	Vaccination and revaccination*	✓	✓	✓	✓	✓
		Variant Omicron XBB.1.5	Vaccination and revaccination*	✓	✓	✓	✓	✓
Nuvaxovid (Novavax)	Protéine	Souche originale	Vaccination and revaccination**				✓	✓

* An additional booster dose is to be administered at least six months after the last dose or infection, regardless of age and the number of previous booster doses given.

** Can be administered if side effects of mRNA vaccines occur.

For more information, please contact your general practitioner, paediatrician or your pharmacy.

QUELS VACCINS POUR QUI?

Vaccin	Plateforme	Souche	Utilisation	Population				
				≥ 6 mois	≥ 5 ans	≥ 12 ans	≥ 18 ans	≥ 30 ans
Comirnaty (BioNTech)	ARNm	Souche originale	Vaccination et revaccination *		✓	✓	✓	✓
		Variant Omicron BA.1 & BA.4.5	Vaccination et revaccination *	✓	✓	✓	✓	✓
		Variant Omicron XBB.1.5	Vaccination et revaccination *	✓	✓	✓	✓	✓
Nuvaxovid (Novavax)	Protéine	Souche originale	Vaccination et revaccination **				✓	✓

* Concernant l'administration d'une dose de rappel additionnelle, un délai d'au moins six mois est à respecter depuis la dernière dose ou infection et ce, quel que soit l'âge et le nombre antérieur de rappels.

** Peut être administré en cas d'effets secondaires des vaccins ARNm.

Pour plus de détails, veuillez contacter votre médecin généraliste, pédiatre ou votre pharmacie.

WELCHE IMPFSTOFFE FÜR WEN?

Impfstoff	Plattform	Stamm	Verwendung	Bevölkerung				
				≥ 6 Monate	≥ 5 Jahre	≥ 12 Jahre	≥ 18 Jahre	≥ 30 Jahre
Comirnaty (BioNTech)	mRNA	Ursprünglichen Stamm	Impfung und Auffrischungsimpfung*		✓	✓	✓	✓
		Omikron Varianten BA.1 & BA.4-5	Impfung und Auffrischungsimpfung*	✓	✓	✓	✓	✓
		Omikron Variante XBB1.5	Impfung und Auffrischungsimpfung*	✓	✓	✓	✓	✓
Nuvaxovid (Novavax)	Protein	Ursprünglichen Stamm	Impfung und Auffrischungsimpfung**				✓	✓

* Für die Verabreichung einer zusätzlichen Auffrischungsdosis muss ein Zeitraum von mindestens sechs Monaten seit der letzten Dosis oder Infektion eingehalten werden, unabhängig vom Alter und der Anzahl der bisherigen Auffrischungsimpfungen.

** Kann bei Nebenwirkungen von mRNA-Impfstoffen verabreicht werden.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Hausarzt /Ihre Hausärztin, Ihren Kinderarzt / Ihre Kinderärztin oder Ihre Apotheke.



WÉI ENG IMPFSTOFFER FIR WEEN?

Impfstoff	Plattform	Stamm	Benotzung	Bevëlkerung				
				≥ 6 Méint	≥ 5 Joer	≥ 12 Joer	≥ 18 Joer	≥ 30 Joer

Comirnaty (BioNTech)	mRNA	Urspréngleche Stamm	Vaccinatioun a Revaccinatioun*		✓	✓	✓	✓
		Omicron Varianten BA.1 & BA.4-5	Vaccinatioun a Revaccinatioun*	✓	✓	✓	✓	✓
		Omicron Variant XBB1.5	Vaccinatioun a Revaccinatioun*	✓	✓	✓	✓	✓

Nuvaxovid (Novavax)	Protein	Urspréngleche Stamm	Vaccinatioun a Revaccinatioun**				✓	✓
-------------------------------	----------------	---------------------	---------------------------------	--	--	--	---	---

* Fir eng zousätzlech Optrëschungsdosis ze ginn, muss eng Period vu mindestens sechs Méint zënter der leschter Dosis oder enger Infektioun agehale ginn.
Dëst ass onofhängeg vum Alter an der Zuel vun Optrëschungsimpfungen déi d'Persoun scho krut.

** Ka bei Niewewierkunge vu mRNA-Impfstoffer benotzt ginn.

**Fir weider Informatiounen, kontaktéiert wgl. Ären Hausdokter/Är Hausdoktesch,
Äre Kannerdokter/Är Kannerdoktesch oder Är Apdikt.**